

SPLENO-HEPATITE MALIGNE D'EVOLUTION FATALE A BRUCELLA MELITENSIS : CAS RARE.

M. Rais; A. Ouyahia; A. Lacheheb

Université Ferhat Abbas1, Faculté de médecine, département des maladies infectieuses Sétif.

Introduction:

La présence de localisations viscérales au cours de la brucellose est exceptionnelle. Le rôle du germe (surtout *B. melitensis* et *B. suis*) doit être discuté : il peut être direct, sous forme de lésions abcédées multiples, ou indirect, par le biais d'une pathologie des complexes immuns Circulants.

Notre objectif est de décrire la gravité de la brucellose en cas de localisation splenohepatique

Matériels et méthodes:

Nous rapportons Une observation inhabituelle d'une spleno-hepatite maligne secondaire à une bactériémie à *Brucella melitensis* associée à une atteinte rénale Dont l'évolution a été rapidement foudroyante malgré un traitement antibiotique adapté.

Observation :

Paramètre	valeur
Age	55ans
D-dimeres	>3000
TB clinique	Alteration de l'état general ; Asthénie ; Amaigrissement
Fièvre	40°c
Créatinine sanguine	25mg/l
Plaquettes	7100
Hémoglobine	6,1g/dl
TP	29%

Discussion et commentaires

La revue la plus complète sur les formes poly viscérales de la brucellose est celle de Sockeel, en 1943. Deux variétés sont décrites : les formes poly viscérales limites ou pauci viscérales, et les formes poly viscérales malignes qui comportent des atteintes viscérales multiples et simultanées, de grande gravité Ces cas, presque toujours dus à *B. melitensis*, sont tous mortels dans la revue de Sockeel. La localisation endocarditique est pour ainsi dire toujours retrouvée, qu'elle soit primitive ou secondaire, et le décès lui est du le plus souvent. L'atteinte hépato-splénique et le syndrome hémorragique (Hémorragies, purpura) sont également de règle. Les atteintes rénales sont fréquentes, surtout sous forme de glomérulo-néphrites et d'infarctus rénaux. Des atteintes pulmonaires ou neurologiques peuvent être associées. Les lésions viscérales sont surtout à type d'infarcissements.

Conclusion : Parmi les nombreuses formes cliniques de la brucellose, il semble que l'on puisse distinguer des observations, rares au demeurant, ou la localisation spleno-hépatique est particulièrement sévère et menaçant jeu le pronostic vital.